



5 gode grunde til at vælge PREVICOX[®]

1. Den mest selektive COX-2-hæmmer til hunde

PREVICOX[®] virker hurtigt og giver effektiv, 24-timers antiinflammatorisk smertelindring med høj COX-2-selektivitet og minimal påvirkning af COX-1.¹

2. Høj sikkerhed og lav bivirkningsprofil

Produktet har en veldokumenteret sikkerhedsprofil med meget få rapporterede bivirkninger og en bred sikkerhedsmargin – også ved langtidsbrug.

3. Videnskabeligt dokumenteret effekt

Effekten og sikkerheden er dokumenteret gennem store, kliniske studier – hvilket giver tryghed i klinisk anvendelse.

4. Velsmagende og nem administration – med eller uden foder

PREVICOX[®] er velsmagende og accepteres godt af hunde.²⁻³

Det kan gives både med og uden foder, hvilket forenkler administrationen i hverdagen.

5. Præcis dosering og bredt indikationsområde


Tabletten kan deles i fire dele, hvilket muliggør præcis dosering ved forskellige indikationer, herunder osteoartrit, ortopædkirurgi, bløddelskirurgi og tandkirurgi.



DOSERINGSSKEMA

57 mg						
Legemsvægt (kg)	3,0 – 5,5	5,6 – 7,5	7,6 – 10	10,1 – 13	13,1 – 16	16,1 – 18,5
Antal tyggetabletter (daglig dosis)						
	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75

227 mg								
Legemsvægt (kg)	7,6 – 10	18,6 – 22,5	22,6 – 34	34,1 – 45	45,1 – 56	56,1 – 68	68,1 – 79	79,1 – 90
Antal tyggetabletter (daglig dosis)								
	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2



Referencer:

- McCann ME, Anderson DR, Zhang D, et al. In vitro effects and in vivo efficacy of a novel cyclooxygenase-2 inhibitor in dogs with experimentally induced synovitis. Am J Vet Res. 2004;65:503-512
- Ryan WG, Moldave K, Carithers D. Clinical effectiveness and safety of a new NSAID, firocoxib: a 1,000 dog study. Vet Ther. 2006;7:119-126.
- Hanson PD, Brooks KC, Case J, et al. Efficacy and safety of firocoxib in the management of canine osteoarthritis under field conditions. Vet Ther. 2006;7:127-140

PREVICOX (firocoxib) 57 mg og 227 mg tyggetabletter til hund. Boehringer Ingelheim Animal Health

Indikationer: Til lindring af postoperativ smerte og betændelse i forbindelse med bløddels-, knogle-, og tandkirurgi samt smerte og betændelse i forbindelse med osteoarthritis hos hund. **Kontraindikationer:** Må ikke anvendes til drægtige og diegivende tæver, hunde under 10 uger eller under 3 kg lgvg. eller dyr med gastrointestinal blødning, blodsykdom eller blødningsforstyrrelser. **Bivirkninger:** Opkastning og diarré er ikke almindelig. Disse reaktioner er sædvanligvis af forbigående karakter og reversible, når behandlingen ophører. Renale eller hepatiske lidelser er rapporteret i meget sjældne tilfælde samt sygdomme i nervesystemet. **Interaktioner:** Må ikke anvendes samtidig med andre NSAID-præparater eller glukokortikosteroider. Ved opstart med Previcox efter forudgående behandling med sådanne præparater bør der være en behandlingsfri periode på mindst 24 timer. Samtidig behandling med lægemidler som påvirker den renale gennemstrømning, som diuretika eller ACE-hæmmere, kræver klinisk overvågning. Samtidig anvendelse af potentielt nyretoksiske præparater bør undgås. Da anæstetika kan påvirke den renale perfusion, bør anvendelse af parenteral væsketerapi under kirurgi overvejes. **Cave:** Den anbefalede dosis bør ikke overskrides. Anvendelse til meget unge dyr eller dyr med nedsat nyre-, hjerte- eller leverfunktion kan medføre øget risiko. Undgå anvendelse til dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr. Undgå samtidig anvendelse af potentielt nyretoksiske stoffer. Det anbefales derfor at udføre relevante laboratorieundersøgelser før og under behandlingen. Behandlingen bør ophøre ved: gentagen diarré, opkastning, blod i fæces, pludseligt vægttab, nedsat ædelyst, sløvhed, ændring af renale eller hepatiske biokemiske værdier. **Drægtighed og diegivning:** Må ikke anvendes til drægtige og diegivende tæver. **Dosering:** 5 mg pr. kg lgvg. en gang daglig. Ved postoperativ smerte i op til 3 dage efter behov. Behandlingen kan, efter dyrlægens vurdering, fortsætte ud over de 3 første dage efter knoglekirurgi, afhængig af det observerede respons. Behandling påbegyndes ca. 2 timer før operation. Tabletterne kan anvendes samtidig med eller uafhængig af fodring. Behandling ud over 90 dage bør overvåges af en dyrlæge. Tabletterne har en krydsformet delekærv på den ene side og kan deles i 2 eller 4 lige store dele. **Pakninger og priser:** Tyggetabletter 57 mg eller 227 mg: Papæske med 1x10 tabletter i blister, papæske med 3x10 tabletter i blister, papæske med 18x10 tabletter i blister og papæske indeholdende beholder med 60 tabletter. Se aktuel dagspris på medicinpriser.dk. **Udl.** B.

Teksten er forkortet i forhold til produktresuméet, som vederlagsfrit kan rekvireres fra Boehringer Ingelheim Animal Health